



Notă

Textul actualizat reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Decizia nr. 10/2007

privind conținutul minim al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din data de 18 decembrie 2007

Text consolidat la data de 10.04.2019

Actul include modificările și/sau completările din următoarele acte:

- Decizie CN nr. 2/2CN/2019 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 10 aprilie 2019.

În temeiul art. 500 și 502 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul național al Colegiului Medicilor Dentiști din România decide:

Art. 1. - (1) În vederea asigurării calității actului medico-dentar, la nivelul fiecărui cabinet de medicină dentară se va asigura o trusă de urgență.

(2) Conținutul minim al trusei de urgență este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexă

(Anexa a fost modificată de Art. I din Decizia CN nr. 2/2CN/2019)

Conținutul minim

al trusei de urgență pentru cabinetul de medicină dentară

A. Aparatură și materiale obligatorii

1.	Tensiometre electronic cu măsurare la încheietura mâinii	1 buc.
2.	Feșe 10 x 10 cm	3 role
3.	Bandă adezivă 5 x 5 cm	2 role
4.	Soluție polividon-iodat (BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE) sau clorhexidină (HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente	1 flacon
5.	Seringi 5 ml/10 ml sterile	5 buc.

B. Medicamente obligatorii

Nr.	DCI (denumirile comerciale sunt listate în paranteză)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerină (NITROGLICERINA)	Cpr. 0,5 mg	1 cutie (20 cpr.)	Se administrează 1 comprimat sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TA _s > 100 mg Hg; se poate repeta administrarea la intervale de 5 min (până la 3-4 comprimate).
	sau Nitroglicerină (MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT)	sau Aerosol 0,4 mg/doză	1 flacon (10 g)	Se administrează 2 pufuri sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TA _s > 100 mg Hg; se poate repeta la 5 min.
2.	Nifedipină (ADALAT, CORDIPIN, CORINFAR, NIFEDIPIN, NIFADIL, NIFELAT)	Cpr. 10 mg	1 cutie (10 cpr.)	Se administrează 1 comprimat sublingual, pentru reducerea TA.
3.	Acid acetilsalicilic (ASPIRINA)	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează 1/2 comprimat mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut.
4.	Enalapril (ENAP)	Cpr. 25 mg	10 buc.	Se administrează 1 comprimat sublingual pentru reducerea TA; la nevoie se mai poate administra 1 comprimat.

5.	Adrenalină 1:1000 sau	fiole 1 mg/1 ml sau	5 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 ml soluție injectabilă nediluată s.c./intra lingual; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TA _s > 90 mm Hg).
	Adrenalină 1:1000 (EPIPEN, EPIPEN 300)	stick autoinjector 0,3 mg (adulți)	2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute, dacă este necesar.
	Adrenalină 1:2000 (EPIPEN JUNIOR, EPIPEN 150)*	stick autoinjector 0,15 mg (copii > 30 kg)	2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute, dacă este necesar.
* Medicament obligatoriu doar în trusa de urgență din dotarea cabinetelor școlare de medicină dentară, conform Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului sănătății nr. 3.764/694/2018.				
6.	Hidrocortizon Hemisuccinat (FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT)	flacon 100 mg sau fiole 25 mg	10 x 100 mg 40 x 25 mg	Se administrează i.m. în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei de astm bronșic sau al crizei Addisoniene.
7.	Prometazină (ROMERGAN)	fiole 50 mg/2 ml	5 buc.	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute.
	sau			
	Loratadină (CLARITINE) sau	cpr. 10 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat în cazul reacțiilor alergice acute.
	Desloratadină (AERIUS) sau	cpr. 5 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat în cazul reacțiilor alergice acute.
	Cetirizină (ZYRTEC)	soluție 10 mg/ml	1 sticlă	Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute.
8.	Salbutamol (BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN)	spray 100 mcg/doză	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri inhalate oral în caz de criză de astm bronșic.
9.	Glucoza 5%	flacon 1000 ml	1 buc.	Se administrează 5-10 ml oral în caz de hipoglicemie.
10.	Diazepam	fiole 10 mg/2 ml	5 buc.	Se administrează 1 fiolă i.m în caz de criză convulsivă.
11.	Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL)	Cpr. 10 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat oral ca analgetic.
	sau			
	Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)	Cpr. 500 mg	5 buc.	
12.	Drotavertină (NO-SPA)	Cpr. 40 mg	10 buc.	Se administrează 1 comprimat oral ca analgetic la pacienta însărcinată.
13.	Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN)**	Cpr. 500 mg	5 buc.	Se administrează 2 g oral pentru antibioprolaxie.
	sau			
	Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE)	Cpr. 600 mg	5 buc.	Se administrează 1 comprimat oral pentru antiprofilaxie.
** Nu se administrează pacienților alergici la peniciline!				

C. Aparatură facultativă:

- butelie de oxigen cu reductor;
- balon de resuscitare;
- pipă orofaringiană.